



ПРОЕКТ
ФІНАНСУЄТЬСЯ
ПРОГРАМОЮ ЄС LIFE



БІЛУГА / HUSO HUSO

Риба-гігант



Є джерелом делікатесу –
дорогої чорної ікри

Зменшення уловів

у **21,5 рази**

за 40 років



Єдиний справжній хижак
з-поміж 6 видів дунайських осетрових




БІЛУГА Є НАЙБІЛЬШОЮ ПРІСНОВОДНОЮ РИБОЮ НА ПЛАНЕТІ.
НАЙБІЛЬША ЗАРЕЄСТРОВАНА ВАЖИЛА 1571 КГ.

Міграція білуги, як і решти осетрових, порушена через спорудження греблі на Залізних воротах. Спад вилову в українській частині Дунайської дельти катастрофічний: 50-ті - 35,7 т/рік; 60-ті – 20,5 т/рік; 70-ті – 9,2 т/рік; 80-ті – 6 т/рік.

Білуга зазвичай харчується рибою, хоча деякі великі особини можуть харчуватися водними птахами.

Хроніки XI ст. визначають Huso huso як надзвичайно важливий харчовий продукт для військ, які йшли вздовж верхнього Дунаю до Австрії.

Білуги мають надзвичайно довгий цикл життя: деякі риби живуть понад 100 років. Інколи їх ловлять у місцях, де нерест виду вже не відбувається.



Падіння вилову білуги за 1990-1993 роки відповідно до офіційних даних. Реальний вилов перевищує офіційний в 3-5 разів.





ПРОЕКТ
ФІНАНСУЄТЬСЯ
ПРОГРАМОЮ ЄС LIFE



РОСІЙСЬКИЙ ОСЕТЕР / ACIPENSER GUELLENSTAEDTI

Аквакультурний осетер



Є досить рідкісним
в українській частині
дельти Дунаю



Ще досі нереститься
в нижній частині Дунаю



Мігрує на значні відстані вверх
за течією перед нерестом



Є найбільш розповсюдженим
видом осетрових в аквакультурі
з-поміж вільноживучих осетрових України

У 1966-1974 РР. У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ
НАРАХОВУВАЛОСЯ ПРИБЛИЗНО 3-4 МЛН. ОСОБИН, ЗА ДАНИМИ ПІВДЕННІРО, ЗАВДЯКИ ЗАРИБЛЕННЮ.
РОЗМІРИ НИНИ ІСНУЮЧОЇ ПОПУЛЯЦІЇ РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА НЕВІДОМІ, АЛЕ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК ДУЖЕ НИЗЬКІ.




Є джерелом
чорної ікри

Російський осетер колись був
найбільш поширеним пред-
ставником осетрових в річці
Дунай. Він регулярно мігував
вверх за течією до Братислави.
Деякі особини були помічені
навіть у Відні (міграція
на відстань 1,925 км)
та Регенсбурзі (2,381 км).

Навесні осетри мігрують
в річку перед самим
нерестом і метають ікру у
нижній течії річки (320-650
км вверх за течією).
Рибини, які розпочинають
нерестовий хід восени,
мігрують аж до першої греблі,
спорудженої на Залізних воротах.

Зменшення виловів
цього виду в українській
частині дельти Дунаю
вважає:
50-ті – 9 т/рік;
60-ті – 0,5 т/рік;
70-ті – 0,6 т/рік;
80-ті – 3,7 т/рік.



Падіння вилову осетра за 1991-1993 роки, відповідно до офіційних
даних. Реальний вилов перевищує офіційний в 3-5 разів.





ПРОЕКТ
ФІНАНСУЄТЬСЯ
ПРОГРАМОЮ ЄС LIFE



СЕВРЮГА / ACIPENSER STELLATUS

Довгоносий осетер



Нерестяться при вищих температурах,
отже, пізніше ніж інші осетрові

Спад уловів за 60 років

у **37** разів



СЕВРЮГА ЗАВЖДИ БУЛА РІДКІСНОЮ У ВЕРХНІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ТЕЧІЯХ ДУНАЮ,
АЛЕ ЗУСТРІЧАЛАСЯ В ДЕКІЛЬКОХ ПРИТОКАХ: ПРУТІ, ТИСІ.
А ТАКОЖ У ПОНИЗЗІ ДНІПРА ТА АЗОВСЬКОМУ МОРІ.

Даний вид мігрує
взимку і навесні. Самці
залишаються на
нерестовищах до 6
тижнів, самки - тільки
протягом 10-12 днів.

Севрюга припиняє їсти
з початком міграції,
як і всі осетрові. Після
нересту вона швидко
повертається в море,
де знову починає їсти.

Спад чисельності
севрюги значний:
50-ті – 9,25 т/рік;
70-ті – 1,6 т/рік.



Є джерелом
чорної ікри



ПРОЕКТ
ФІНАНСУЄТЬСЯ
ПРОГРАМОЮ ЄС LIFE



ОСЕТЕР ШИП / ACIPENSER NUDIVENTRIS

Осетер-примара



Даний вид знаходиться
на межі вимирання



Легко відрізнити за першою, найбільшою
за розмірами спинною жучкою



ЧИСЕЛЬНІСТЬ ШИПА НІКОЛИ НЕ БУЛА ЗНАЧНОЮ В БАСЕЙНІ ДУНАЮ.
ВОСТАННЄ ВИЛОВ ШИПА НА ДУНАЇ БУВ ЗАДОКУМЕНТОВАНИЙ В 2009 Р. В БУДАПЕШТІ.
В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕЛЬТІ ДУНАЮ ВІДОМІ ОКРЕМІ ВИПАДКИ ВИЛОВУ ШИПА ЗА ДЕСЯТИЛІТТЯ.

Шип в Україні, Румунії та Болгарії занесений до списку вимерлих видів. Останні знахідки були у 90-ті рр. біля Криму, у 1994 році шипа завдовжки 70 см зустріли у Каркінітській затоці, у 2005 році - у середній течії Дунаю (вище Залізних воріт) спіймали плідну самку.

Шип любить жити в морі, поблизу берегів і лиманів, а в прісних водоймах - в широких руслах річок.

Шип проводить більшість свого життя в морі, мігруючи в ріки під час нересту. Але відомі й немігруючі прісноводні популяції шипа.

Шип є найпліднішим з родини осетрових





ПРОЕКТ
ФІНАНСУЄТЬСЯ
ПРОГРАМОЮ ЄС LIFE



СТЕРЛЯДЬ / *ACIPENSER RUTHENUS*

Прісноводний осетер



Живе переважно в прісній воді,
на відміну від інших осетрових
не мігрує з Чорного моря



Серед усіх осетрових в Дунаї
стерлядь є найменшою за розміром



Перевиллов
в основному заради
м'яса є основною
загрозою для виду



ПОПУЛЯЦІЯ СТЕРЛЯДІ В ДУНАЇ СКОРОЧУЄТЬСЯ
З МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.

Вид досягає статевої
зрілості у дикій природі
рано: самці стерляді
у віці 4-5 років,
а самки – в 6-7 років.

На відміну від інших видів, не
мігрує. За допомогою
маркування визначили, що
максимальна відстань
мігрування Дунаєм для цього
виду становить 300 км.

Єдина інформація про вилов
стерляді в Дунаї датується
1958-1981 рр. Обсяг вилову
становив від 117 т в 1963 р. до
36 т в 1979 р., при середньому
вилові 63,5 т на рік.

Угорщина, Болгарія і
Румунія запровадили
програму для
збільшення популяції
стерляді в Дунаї.

Наразі найбільш широко
розповсюджений вид
осетрових у басейні Дунаю





ПРОЕКТ
ФІНАНСУЄТЬСЯ
ПРОГРАМОЮ ЄС LIFE



ОСЕТЕР ЄВРОПЕЙСЬКИЙ / ACIPENSER STURIO (раніше атлантичний)

Загублений осетер



Найрідкісніший вид серед українських диких осетрових



Єдині дикі популяції існують в річках Гаронна та Дордонь у Франції, і також у річці Ріоні в Грузії



Статус, згідно Червоної книги України, - зниклий вид



ОСТАННІЙ ПРЕДСТАВНИК ОСЕТРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (АБО АТЛАНТИЧНОГО) В ДУНАЇ БУВ ЗАФІКСОВАНИЙ У 1960-Х РОКАХ.

Європейський осетер завжди був найбільш рідкісним видом осетрових в басейні Чорного моря. Його присутність була задокументована востаннє у 1960-х роках.

Осетер європейський мігрує в річки з січня до жовтня, пік міграції зазвичай припадає на період високої води: квітень-травень.

Колись цей осетер нерестився в нижньому Дунаї, оскільки в 1930-х рр. були зафіксовані гібриди даного виду з іншими осетровими.

В минулому даний вид був зафіксований в Атлантиці, Ла-Манші, Середземномор'ї і Чорному морі



Колись піднімався до верхів'я всіх основних річок цих регіонів для нересту

